

La thrombocytopénie induite par l'héparine

Qu'en est-il?

14 octobre 2009 — **CHUL, CHU de Québec**
salle A-0330

20 octobre 2009 — **Université de Montréal**
salle S-116
pavillon Roger-Gaudry

Conférence disponible en Web diffusion
du 2 novembre 2009 au 2 février 2010

Soirées et conférence Web réservées exclusivement aux **MEMBRES ACTIFS** et **MEMBRES RÉSIDENTS** de l'A.P.E.S.

Soirées de formation et développement offertes par



L'héparine est un médicament grandement utilisé au Canada, avec lequel malheureusement de nombreux incidents sont rapportés. Environ le tiers des patients hospitalisés sont exposés à l'héparine. La thrombocytopénie induite par l'héparine (TIH) est une complication clinique pouvant engendrer des conséquences très graves, d'où l'importance d'une prise en charge adéquate et rapide.

Le diagnostic de la TIH peut parfois être complexe. La prise en charge de cette pathologie comporte aussi certains pièges qui doivent être évités. De plus, les données probantes sur le sujet ne sont pas suffisantes en raison du petit nombre d'études cliniques disponibles et des nombreux biais qu'elles contiennent. Il n'est donc pas facile pour les cliniciens de s'y retrouver.

Quelques médicaments sont actuellement disponibles sur le marché canadien pour traiter ou prévenir la TIH. Chacun possède des caractéristiques qui lui sont propres. Une connaissance adéquate de ces médicaments, de la pathologie ainsi qu'un respect de ses principes de traitement s'impose afin de permettre une prise en charge adéquate de la TIH et de diminuer significativement la morbidité ou la mortalité qui peuvent y être associées.

Inscrivez sans tarder les dates du **14 octobre** (Québec) et du **20 octobre** (Montréal) à votre agenda. Faites parvenir votre **FORMULAIRE D'INSCRIPTION** au secrétariat de l'A.P.E.S par télécopieur au 514 286-1081.

Si vous ne pouvez vous rendre à une de ces présentations, vous pourrez voir et entendre nos deux conférenciers en visionnant leur conférence sur le Web. Elle sera disponible du 2 novembre 2009 au 2 février 2010 sur le site Web de l'A.P.E.S. sous l'onglet « formation continue ».

Les **soirées de formation et développement** de l'A.P.E.S. sont offertes sans frais aux membres actifs et aux membres résidents de l'A.P.E.S. grâce à une enveloppe budgétaire du MSSS dédiée à la formation et au développement dans le cadre de l'Entente de travail négociée par l'A.P.E.S.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom	Prénom
Établissement	
No de permis	
Courriel	

Mercredi, 14 OCTOBRE 2009	✓
◆ CHUL, CHU de Québec, salle A-0330	
Mardi, 20 OCTOBRE 2009	✓
◆ Université de Montréal, pav. Roger-Gaudry, salle S-116	

IMPORTANT Les documents présentés au cours des soirées seront disponibles sur le site Web de l'A.P.E.S. à l'adresse <http://www.apesquebec.org/formation/> le 9 octobre. La conférence sera disponible en Web diffusion du 2 novembre 2009 au 2 février 2010 sous l'onglet « Formation continue » sur le site Web de l'A.P.E.S..

LES SOIRÉES DE FORMATION ET DÉVELOPPEMENT ET LA WEB DIFFUSION SONT RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX MEMBRES ACTIFS ET AUX MEMBRES RÉSIDENTS DE L'A.P.E.S.

L'Ordre des pharmaciens du Québec accordera des UFC (unités de formation continue) aux pharmaciens qui auront assisté à l'ensemble de cette formation.

POUR INFORMATION : 514 286-0776



18 h 30 **La thrombocytopénie induite par l'héparine. Qu'en est-il?**

- Définitions
- Pathophysiologie
- Incidence
- Complications
- Tests diagnostics
- Les 4T
- Choix d'un agent
- Pharmacologie des agents alternatifs
- Relai à un agent oral
- Cas particuliers
- Algorithme de traitement
- Utilisation d'héparine ou HFPM après une TIH
- Coûts des différents agents pour la durée totale de traitement

20 h 30 **Questions et commentaires**

20 h 45 **Fin de la soirée**

Objectifs :

À la fin de la présentation, les participants seront en mesure :

- de connaître la pathologie associée à la TIH
- de définir les critères diagnostics de la TIH
- d'être en mesure de collaborer avec l'équipe traitante à la prise en charge de la TIH
- de connaître les médicaments disponibles pour prévenir ou traiter une TIH ainsi que leurs caractéristiques
- de prodiguer les soins pharmaceutiques nécessaires à un patient atteint de TIH
- de sélectionner les médicaments à garder dans un centre hospitalier en fonction de la clientèle
- d'assurer le traitement et le suivi adéquat d'un patient atteint de TIH

Les conférenciers :

Marie-Claude Michel, B.Pharm., M.Sc., est pharmacienne au CHUL du Centre Hospitalier Universitaire de Québec. Elle collabore au PGTM depuis 2006 et est coordonnatrice du programme depuis 2007.

Martin Turgeon, B.Pharm., M.Sc., est pharmacien au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il est clinicien associé de l'Université de Montréal.