

QUELS SONT LES RÔLES ET LES RETOMBÉES DU PHARMACIEN DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ANTICOAGULÉS ?

Anaïs Barbier¹, candidate au Pharm. D, Éléonore Ferrand¹, candidate au Pharm. D, Jean-François Bussières^{1,2}, B.Pharm., M.Sc., MBA, F.C.S.H.P

1- Unité de Recherche en Pratique Pharmaceutique, CHU Sainte-Justine, Montréal (Québec) Canada;

2- Chef du département de pharmacie et Unité de recherche en pratique pharmaceutique, CHU Sainte-Justine, professeur titulaire, Faculté de pharmacie, Université de Montréal, (Québec) Canada.

Introduction: Les thérapies anticoagulantes figurent parmi les médicaments de niveau d'alerte élevé. Un suivi rapproché est indispensable afin de garantir un bon niveau de coagulation et éviter la survenue d'hémorragies ou de thromboses.

Objectif : Identifier les rôles et les retombées du pharmacien dans la prise en charge des patients anticoagulés.

Méthodologie : Revue documentaire menée sur PubMed à partir des mots clés suivants : pharmacist OR clinical pharmacy OR pharmaceutical care AND anticoagulation du 1^{er} janvier 1990 au 10 mars 2016 associée à une recherche manuelle. Ont été extraits pour chaque article, le type et la description des interventions pharmaceutiques, des indicateurs descriptifs et/ou de résultats. Seules des analyses descriptives ont été réalisées.

Résultats : Au total, 76 articles ont été inclus. Les interventions pharmaceutiques décrites comprenaient l'évaluation de la pharmacothérapie (n=60), le transfert de connaissances (38), le suivi des patients (32), le travail interdisciplinaire (22), la conciliation médicamenteuse (11), l'évaluation des besoins des patients (8), la relation patient-pharmacien (3), la gestion et la préparation des médicaments (3), le maintien des compétences (2). L'impact des interventions a été étudié avec un total de 497 indicateurs dont 288 (58%) indicateurs de résultats. Parmi eux, 171 (59%) étaient positifs, 114 (40%) neutres et 3 (1%) négatifs. Le pharmacien permet notamment d'améliorer le nombre de patient ayant un INR compris dans l'intervalle thérapeutique et la qualité des ordonnances.

Conclusion : Les indicateurs de résultats utilisés dans ces études montrent un impact positif des pharmaciens dans la prise en charge des patients anticoagulés.