

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA PRÉPARATION ET L'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS DANGEREUX EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Delphine Hilliquin¹, candidate au Pharm.D, Cynthia Tanguay, B. Sc., M.Sc.¹,
Jean-François Bussièrès^{1,2}, B.Pharm., M.Sc., M.B.A., F.C.S.H.P., F.O.P.Q.

1- Unité de Recherche en Pratique Pharmaceutique, CHU Sainte-Justine, Montréal (Québec) Canada;

2- Faculté de pharmacie, Université de Montréal, Montréal (Québec) Canada

Introduction : L'Association pour la santé et la sécurité au travail met à jour son Guide sur la manipulation des médicaments dangereux. Le National Institute for Occupational Safety and Health classe maintenant les médicaments dangereux en trois groupes.

Objectif : Recenser les pratiques entourant certains enjeux de la préparation et de l'administration des médicaments dangereux en établissement de santé.

Méthodologie : Un sondage en ligne a été envoyé par courriel (deux rappels) aux chefs de départements de pharmacie du Québec. L'enquête comportait six parties : démographie, utilisation du guide, pratiques en pharmacie, en soins et en hygiène et salubrité, utilisation de circuits fermés, nettoyage des surfaces et pratiques pour les trois groupes de médicaments dangereux. Les commentaires reçus ont été compilés.

Résultats : Le taux de réponse était de 72 % (41/57). Les répondants se disaient satisfaits/très satisfaits du guide (37/41). Différentes mesures de prévention étaient utilisées : retrait des emballages externes (38/41), lavage des fioles (37/41), amorçage à la pharmacie (29/41) et masque à cartouche pour grand nettoyage (37/41). Une majorité n'utilisait pas de circuits fermés ni pour la préparation ni pour l'administration (25/41). Une évaluation pratique des employés était offerte à la pharmacie (36/41), en hygiène (11/41) et en soins infirmiers (8/41). Plusieurs ont souligné la difficulté à mettre en place des pratiques pour les groupes deux et trois.

Conclusion : Ce sondage révèle que plusieurs pratiques du Guide sont largement implantées dans les centres. Sa révision devra suggérer des pratiques pour les trois groupes de médicaments dangereux.