



bulletin d'information officiel

de la SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE
DES PHARMACIENS D'HÔPITAUX

Juillet 1971

Vol 4 No 7

EXEMPLE D'UNE FORMULE...

RELEVÉ DES ERREURS DANS LA THÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE

Services pharmaceutiques

- 1) NUMÉRO DU DOSSIER IMPLIQUÉ UNITÉ DE SOINS
- 2) MÉDICATION PRESCRITE
 - Nom
 - Forme (orale, inj., etc.)
 - Posologie
- 3) MÉDICATION ADMINISTRÉE
 - Nom
 - Forme (orale, inj., etc.)
 - Voie d'administration (I.M., I.V., etc.)
 - Heure Date
- 4) CONSTATIONS DE L'ERREUR
 - Personne qui a constaté l'erreur:
 - Etiez-vous responsable de l'administration de cette médication?
 - Circonstances de l'erreur
- 5) CONSÉQUENCE (S) DE L'ERREUR
 - Réaction du patient
 - Consultation médicale demandée
 - Traitement nécessité par cette erreur
- 6) L'ERREUR A ÉTÉ SIGNALÉE AU
 - Dossier Médecin
 - Responsable de l'unité de soins

Signature de la personne qui a rapporté l'erreur
(utile, mais non indispensable)

Remarques

Pour que cette formule atteigne son but, c'est-à-dire celui de corriger une situation non acceptable, à savoir de nombreuses erreurs dans l'administration

de la médication (30% selon des statistiques américaines), nous devons vous rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'impliquer des personnes mais bien de corriger des situations. C'est pourquoi nous nous

engageons à garder confidentiellement soit le rapport ou le nom de la personne ou les deux, chaque fois qu'on en exprimera le désir.

Il devient donc essentiel que toute erreur de quelque nature que ce soit dans l'administration de la médication, soit rapportée fidèlement et c'est à partir de ces données qu'il nous incombera de trouver des solutions.

Nous comptons donc sur la collaboration de toutes les personnes impliquées dans l'administration des médicaments.

Aussitôt complétée, acheminer cette formule en deux (2) copies au chef des Services Pharmaceutiques.

Une (1) copie sera transmise à la Directrice des Soins Infirmiers

Chef des Services Pharmaceutiques.

NOTRE SECRÉTAIRE NOUS QUITTE POUR ASSURER DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES À LA DIRECTION DES AFFAIRES PHARMACEUTIQUES.

Arthabaska, le 24 juin 1971.

Monsieur Yves Courchesne, L. Pharm.,
Hôpital Hôtel-Dieu,
3840 St-Urbain,
Montréal 131, Qué.

Mon cher Yves,

Pour faire suite à notre entretien téléphonique du 23 courant, je te confirme par la présente ma démission comme secrétaire de la S.P.P.H. et comme représentant de la région numéro 3 au conseil d'administration de la S.P.P.H.

Étant donné le travail amorcé, c'est avec regret que je quitte mon poste. Le travail de secrétaire est ingrat quelquefois mais je l'ai fait avec plaisir. Je laisse des

amis avec qui j'ai aimé travailler.

Amitiés à tous les membres du Conseil d'administration de la S.P.P.H. et au revoir,

Roch Labrecque.

AVIS-DIVERS

COURS SUR LES INTERACTIONS

L'Université de Montréal a pour projet de donner deux jours de "cours Blocs" à l'automne prochain soit vers le 12 et 13 novembre prochain (Vendredi p.m., soir et samedi ad. 17 ou 18 heures.)

Les cours seront sur les interactions et feront suite à la série de deux cours sur le même sujet publiés par la division de l'Éducation continue de l'ordre des pharmaciens. Mme Marinier principale responsable et promoteur de ce projet me fournira tous les détails nécessaires lorsqu'il se concrétisera et je vous en ferai part via ce bulletin.

Toutefois réservez déjà les dates du 12 et 13 novembre prochains pour assister à ces cours blocs organisés par la faculté de Pharmacie de l'Université de Montréal.

DEMANDE D'EMPLOI

Disponible immédiatement

Jean Claude Marcelin, 29 ans, né le 23 juin 1942

Adresse 1122, Villeray E App. 411
Montréal 328

ou a/s 2301, Côte Ste Catherine,
Outremont, Montréal. Tél.: 733-0281

Études B.A. Port au Prince Haiti

Diplômé en pharmacie Haiti

C.O.F.I. Centre de formation des Immigrants (Anglais)

Emplois: 1- Enseignement chimie et Biologie - Commission Scolaire régionale de l'Estrie (Sherbrooke) 1969-1970

2- Hôtel Dieu de Sherbrooke (8 jours) Laissé pour enseigner

1- Hôpital St-Vincent de Sherbrooke 1970 été
Hôpital Notre Dame de Montréal

Arrivé septembre 1968.

Léon Cheton L. Ph.

3850 Côte Ste Catherine App. 8

Tél.: 737-0928

Mme Françoise Brodeur, L. Ph., D.P.H.

Tél.: 739-6271

Nicole Chilliard, B. Ph.

185 Willowdale

Tél.: 739-6271

Marie-Cécile Jaquet. B. Ph.

1073 Mackay

Tél.: 861-6505

Guy Boicclair, E. Ph. 3e année

3516 Aylmer

Tél.: 842-2393

Disponible immédiatement pour Région de Montréal seulement

Madame Alarcia

1010, Cherrier App. 709

Montréal

Tél.: 524-8497

Équivalence de l'U. de Montréal

Cours à Barcelone

OFFRE D'EMPLOI

Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup demande un pharmacien, comme deuxième à temps complet. S'adresser à:
Claude Villeneuve
Chef des services de pharmacie.

L'Hôtel-Dieu de Sherbrooke est à la recherche de deux (2) pharmaciens. S'adresser à Soeur Emma, Pharmacienne, Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Un pharmacien-chef est demandé pour un hôpital de 111 lits.
Hôpital d'Amqui
Louis Blouin M.D.
tél.: (418) 629-2211

Pharmacien licencié demandé pour résidence de personnes âgées (312 lits). Préférence au diplômé en pharmacie d'Hôpital. Envoyer curriculum vitae au:
Directeur Général
Manoir Verdun
5500, Boul. Lasalle
Verdun, Montréal 204

Pharmacien licencié avec diplôme ou certificat en pharmacie d'hôpital de préférence, pour hôpital St-Joseph à Rimouski. S'adresser à:
Marcel Bergeron, L.Ph.m.,
Hôpital St-Joseph
Rue Rouleau
Rimouski, Tél.: (418) 723-7851

Ce bulletin est l'organe officiel de la S.P.P.H., c.p. 176 station E, Montréal 151, Qué. Toute contribution doit parvenir à l'éditeur avant le 5 du mois. Adressez vos envois à l'éditeur: Pierre Racette, L.Pharm. 300 boul. Wilfrid Hamel, Québec 8, Qué.

ÉTAT DES FINANCES DE LA

S.P.P.H.

5/7/71

Solde au 1er janvier 71 \$2,345.60

Recettes

| | |
|--------------------|-------------|
| Cotisation membres | \$15,250.00 |
| Intérêts bancaires | 35.66 |
| Sessions études | 3,768.25 |
| | <hr/> |
| | 19,053.91 |
| | <hr/> |
| | \$21,399.60 |

Dépenses

| | |
|-----------------------|-----------|
| Timbres | 308.55 |
| Secrétariat | 132.00 |
| Téléphone, télégramme | 891.69 |
| Déplacement représ. | 4,108.39 |
| Sessions études | 1,061.38 |
| Honoraires profes. | 4,138.75 |
| Imprimerie | 2,050.82 |
| Frais de banque | 16.15 |
| Divers | 653.95 |
| | <hr/> |
| | 13,361.68 |

A nouveau \$ 8,037.92

Membres en règle

| | | |
|-----------|---|-------|
| Région no | 1 | 69 |
| | 2 | 26 |
| | 3 | 10 |
| | 4 | 12 |
| | 5 | 17 |
| | 6 | 15 |
| | | <hr/> |
| | | 149 |

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

de la S.P.P.H.

Trois Rivière le 5 juillet 1971
à 13 h 30

- 1) Mot de bienvenue du Président
- 2) Vérification des présences
- 3) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 juin 1971
- 4) Adoption de l'ordre du jour
- 5) Démission du secrétaire
- 6) Rapport du trésorier
- 7) Rapport des Comités
- 8) Correspondance
- 9) Affaires nouvelles
- 10) Date de la prochaine réunion
- 11) Levée de la réunion

QUIZ

- a) Les barbituriques sont métabolisés principalement dans le foie à l'exception de:
a) pentobarbital(), b) secobarbital(), c) phénobarbital(), d) barbital().
- 2) Un effet secondaire commun au chlordiazepoxide et au diazepam en plus de l'étourdissement, est:
a) hypertension(), b) ataxie(), c) agranulocytose().
- 3) La nortryptiline, en commun avec....., a des propriétés stimulantes et dépressives;
a) Nardil(), b) Parnate(), c) Elavil().
- 4) La desipramine, un métabolite de l'imipramine, semble posséder l'avantage de:
a) produire moins d'effets secondaires() b) début d'action plus rapide() c) plus forte activité anticonvulsivante() d) effet plus prononcé sur S.N.A.()
- 5) "Pertofrane" (chl. de désipramine) est aussi commercialisé sous le nom de:
a) Elavil(), b) Aventyl(), c) Norpramine().
- 6) "Jectofer" (I.M.) est indiqué dans les cas d'anémies ferriprives; si l'énémie n'est pas due à une déficience en fer, ce médicament peut causer:
a) agranulocytose() b) hémosidérose() c) cirrhose hépatique()
- 7) Une dose de 525 mg. de sulfate ferreux équivaut à mg. de fer élémentaire.
a) 105(), b) 75(), c) 42.7(), d) 141().
- 8) La pénicilline V diffère des autres pénicillines orales par la propriété suivante:
a) spectre plus étendu() b) peu affectée par l'acide de l'estomac et la nourriture() c) agit sur les organismes producteurs de pénicillinase()
- 9) L'amphotericine B employée dans les infections dues au Candida albicans est associée pour administration orale, à:
a) grise fulvine(). b) nystatine(), c) tetracycline,() d) lincomycine()
- 10) L'éthylestrenol (Maxibolin) est un stéroïde anabolique dérivé de:
a) désocorticoïdostérone() b) oestradiol(), c) progesterone(), d) testosterone()
- 11) Pronestyl est le nom commercial de:
a) protoveratrine A(), b) propoxyphène(), c) procainamide()
- 12) Celestone Soluspan, contient du phosphate de betaméthasone à action rapide et un de betaméthasone pour un effet prolongé.
a) sodium succinate(), b) acetate(), c) acetonide(), d) propionate()
- 13) Poids pour poids, la betaméthasone est plus active que la prednisonne après administration orale:
a) 5 fois(), b) 10(), c) 18(), d) 30()
- 14) La betaméthasone tout comme la dexaméthasone a tendance à produire:
a) leucopénie (), b) hypotension orthostatique(), c) tachycardie, d) gain de poids()
- 15) Le Candeptin (candicidine) est un antifongique employé dans le traitement de:
a) actinomycose(), b) histoplasmose(), c) moniliase vaginale(), d) tinea pedis()
- 16) Le tolnaftate (Tinactin) pour usage topique dans les infections fongicides de la peau, est un dérivé de:
a) nystatine(), b) hydroxyquinoline(), c) candicidine(), d) aucun des trois()
- 17) Serax (oxazepam) est un tranquillisant qui possède une structure chimique et une activité reliées à:
a) Largactil(), b) Equanil(), c) Librium(), d) Atarax()
- 18) Indocid (indométhacine) tout comme d'autres agents anti-inflammatoires peut causer:
a) hémorragie gastro-intestinale(), b) glaucome(), c) acrocyanose() d) syndrome de Cushing()
- 19) Presque toutes les souches de sont résistantes à l'ampicilline:
a) pseudomonas aeruginosa(), b) E. coli(), c) Salmonella(), d) Shigella()
- 20) La vitamine E est une vitamine:
a) liposoluble(), b) hydrosoluble(), c) non essentielle() d) aucun des trois()
- 21) Le nom "générique" du Gantanol est:
a) sulfachlorpyridazine(), b) sulfadime thoxine(), c) sulfame thoxole() d) sulfaméthoxyypyridazine()
- 22) La structure chimique de Gantanol se rapproche de:
a) Gantrisin(), b) Elkosin(), c) Dynex(), d) Madribon()
- 23) L'acide nalidixique (Neg Gram) est indiqué dans les infections urinaires causées surtout par:
a) proteus(), b) pseudomonas(), c) clostridium()
- 24) L'angiotensine (Hypertensine) produit une hausse de pression accompagnée de réduction de:
a) rythme cardiaque(), b) circulation coronarienne(), c) temps de coagulation(), d) résistance périphérique des vaisseaux()
- 25) Les cations di et trivalents interfèrent dans l'absorption de la tétracycline au niveau gastro-intestinal; surtout:
a) aluminium(), b) calcium(), c) magnesium(), d) les trois()
- 26) La papavérine est un alcaloïde obtenu à partir de:
a) quinquina(), b) veratrum(), c) rauwolfia(), d) opium()
- 27) Triavil est une association de:
a) desipramine & trifluopérazine(), b) nortriptyline & mepazine() c) amitriptyline & perphenazine(), d) aucune des trois()
- 28) Un nom commercial pour desipramine parmi les suivants est:
a) Aventyl(), b) Elavil(), c) Nardil(), d) Pertofrane()
- 29) Un nom commercial pour perphenazine parmi les suivants est:
a) Dartal(), b) Triladon(), c) Stelazine()
- 30) B A L (dimercaprol) s'administre à raison de mg./kilo.
a) 10(), b) 7.5(), c) 2.5(), d) 1().

Claude Richer L.Pharm.

Réponses au prochain numéro.

SUITE DE LA PAGE 4

Lipomul suspension
Lipril liquide
Maltévol-12 liquide
Tonique multivitaminé avec fer
Tonique multivitaminé péd.
Osto-ADC gouttes
Ostoco gouttes
Ostogen gouttes
Ostogen-A gouttes
Ostomul liquide
Pinkifer liquide
Poly-vi-flor gouttes
Poly-vi-sol gouttes
Tri-vi-flor gouttes
Tri-vi-sol gouttes
Vivacalcium composé B 12 amp.
Pinkamin-B liquide

RÉFÉRENCE

Canadien Pharmaceutical Journal, vol. 103, no. 12 déc. 1970.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Lise Allaire, L. Pharm.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE Suite du bulletin précédent

BIBLIOGRAPHIE

- (1) Journal of Allergy, 30:35, 1959.
- (2) J.A.M.A., 143:736, 1950.
- (3) J.A.M.A., 161:693, 1956.
- (4) Journal Pharm. and Exp. Therap.,

CONCLUSION

Bref, pour l'établissement d'une thérapeutique rationnelle de l'asthme bronchique, il serait utile de retenir que:

La solution hydro-alcoolique (80 mg de théophylline/15ml) donne une concentration sanguine supérieure à tous les autres sels ou dérivés de la théophylline (y compris l'aminophylline).

De plus, dans le cas d'une crise d'asthme, 75ml de cette solution agissent plus efficacement que 250 mg d'aminophylline intra-veineuse (patients à domicile).

L'aminophylline intra-veineuse est toujours efficace et peut être employée avec succès dans l'asthme aigu.

Toute théophylline en **suppositoires** s'est avérée peu fiable.

L'administration d'aminophylline en **aérosol** semble inefficace.

Toxicité: Notez que la théophylline peut **s'accumuler** dans l'organisme: il serait donc prudent que les doses d'entretien soient maintenues à leur concentration minimale efficace (20).

LIQUIDES PER OS NE CONTENANT PAS DE SUCRE

Voici une liste de préparations liquides qui pourra s'avérer utile, entre autre, lors du choix d'une médication sans sucre pour le patient diabétique.

- 1) **Analgésiques**
Actifed-A élixir
Tylénol gouttes
- 2) **Anti-acides, antispasmodiques**
Alasil gel liquide
Aludrox suspension

Amphojel
Amphojel-SA
Ancatropine gel
Ancatropine gel rose
Ancatropine gel (simple)
Ancatropine gouttes péd.
Buffergel liquide
Diminul suspension
Diovol suspension
Duatrol suspension
Fermentol liquide
Gélusil liquide
Kolantyl gel
Lait de magnésie
Mylanta suspension
Oxaine suspension
Oxaine-M suspension
Riopan suspension
Stélabid élixir
Taka-diastrase liquide
Valpin-PB élixir
Valpin élixir

- 3) **Anti-asthmatiques**
Brondécon élixir
Corivin élixir
Dilin élixir
Dimetapp élixir
Elixophylline élixir
Isuprel élixir composé
Solucodan sirop
Solucodan-H sirop
tédral élixir
Théophylline élixir
- 4) **anticonvulsivants**
Mysoline suspension
- 5) **Antidiarrhéiques**
Atasorb liquide
Bismuth hydrate suspension
CHO-Free
Kalpec suspension
Kao-Con suspension
Kaomycine suspension
Polymagma suspension
Sulfapectin
- 6) **Anti-infectieux**
Compocillin-V suspension
Declomycin sirop
GT-liquide
Mandélamine suspension
Mandélamine suspension forte
Mycifradin solution orale
Pen-vee suspension
Polymagma suspension

Streptomagma suspension
Terramycin gouttes péd.
Terramycine sirop
Tetracyne sirop

- 7) **Antihémorragiques**
CVP avec vitamine K sirop
- 8) **Antipsychotiques**
Haldol gouttes
Mellaril solution
- 9) **Anti-tussifs, expectorants**
Ancatussin liquide
Cophylac
Cophylac expectorant
Dimetapp élixir
Novahistex expectorant
Omni-Tuss liquide
Pédial gouttes
Sinutab suspension péd.
Sudafed
théo-Organidin
Trachéol
tussionex suspension
Tussi-Organidin
- 10) **Laxatifs**
Agarol émulsion
Cas-Evac solution
Colace gouttes
Colace sirop
Kondrémul émulsion
Magnolax émulsion
Lait de magnésie
Modane liquide
- 11) **Sédatif**
Butisol sodium
- 12) **Vitamines-minéraux-suppléments nutritifs**
Adeflor gouttes
Aguasol-A gouttes
Aguasol A&D gouttes
B-Plex élixir
B-Plex et fer élixir
Cadol gouttes
Cobanca liquide
Ferro-drops
Hépatcholine-sorbitol amp.
Iberet liquide
Incremin et fer liquide
Infantol gouttes
Infantol liquide
Kaon élixir
Kay ciel élixir